Abb. 1

ÄSTHETISCH HOCHANSPRUCHSVOLLE FRONTZAHNLÖSUNG MIT KERAMIK-IMPLANTAT

Abb. 1: Ausgangssituation: Zahn 12 endodontisch behandelt aber nicht erhaltungswürdiger Zahn, Nichtanlage des Zahnes 21, Zahn 22 kieferorthopädisch an die Stelle von Zahn 21 gerückt.
Therapie: Extraktion von Zahn 12, Ersatz durch ein Keramikimplantat. Veneer-Versorgung der Zähne 11, 22 und 23 zur Umformung zu 21 und 22.

Abb. 2: Ausgeheilte Situation sechs Monate nach Extraktion des Zahnes 12.

Abb. 3: Minimalinvasive OP-Technik mittels Stanze.

Abb. 4: Stanzung.

Abb. 5: Knochendarstellung nach Entfernung des Stanzgutes.

Abb. 6: Ankörnen des Knochens mit Rosenbohrer.

Abb. 7: Sichtbare Ankörnung des Knochens.

Abb. 8: Pilotbohrung.

Abb. 9: Ausrichtung und Längenvorgabe für die Implantatalveole.

Abb. 10: Ausformung des Implantatbettes mit dem Bohrer für ein konisches Implantat.

Abb. 11: Bis auf die endgültige Länge eingesenkt.

Abb. 12: Vorschneiden des Gewindes.

Abb. 13: Entnahme des Implantates aus der Sterilverpackung mit Handinstrument.

Abb. 14: Einschrauben des Implantates und Auffinden des Gewindes.

Abb. 15: Eindrehen, bis der erste Widerstand kommt.

Abb. 16: Festziehen des Implantates mit Handratsche, maximal 35 N/mm.

Abb. 17: Aufsetzen der Einheilkappe.

Abb. 18: Wundverschluss mit Solcoseryl Dentaladhäsivpaste.

Abb. 19: **Tipp:** Die Oberfläche der Salbe mit viel Wasser gelieren, damit sie nicht mehr klebt.

Abb. 20: Situation nach drei Monaten, vor Präparation.

Abb. 21: Situation nach drei Monaten, vor Präparation.

Abb. 22: Situation nach drei Monaten, vor Präparation.

Abb. 23: Eröffnen des Implantates mit einem Tissuetrimmer.

Abb. 24: Freigelegte Einheilkappe.

Abb. 25: Entnahme der Einheilkappe.

Abb. 26: Nach Reinigen und Trocknen, Einfüllen des Klebers (Zeraglu).

Abb. 27: Einstecken des Abutments mit dem Abutmenthalter.

Abb. 28: Abutment mit eingelegten Adrenalinfäden zur Blutstillung.

Abb. 29: Präparierte Situation vor Abformung.

Abb. 30-32: Ästhetisch sehr ansprechendes Ergebnis.

Abb. 33-34: Ansprechender Gingivaverlauf bei hoher Lachlinie.

Abb. 36: OPG Ausgangsbild mit endodontisch behandeltem Zahn 12.

Abb. 35: Fertige Restauration von palatinal.

Abb. 37: OPG Messaufnahme nach sechs Monaten.

Abb. 38: OPG Kontrollaufnahme nach Implantation.

Dr. Michael Leistner

- 1978-1981 Ausbildung in der Zahntechnik
- 1989 Examen, Approbation u. Promotion an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Studiengang Zahnmedizin
- 1989 Wissenschaftl. Tätigkeit für Krupp Medizintechnik mit Schwerpunkt Titan-schweißung, Abteilung Prof. Dr. Kappert
- 1991 niedergelassen in eigener Praxis
- 1994 Referent zum Thema Vollkeramik
- 2001 Sieger russischen Stomatologie Meisterschaft
- 2002 Referent zum Thema Implantologie
- 2003 Internationale Referententätigkeit
- 2005 Referent zum Thema Metallfreie Stifte
- 2007 Gründung einer überregionalen Praxisgemeinschaft
- 2009 Zahnärztliche Zulassung in Porto (Portugal)
- 2012 Referent zum Thema vollkeramische Implantate

■ info@dent-design.de
 ■ www.dent-design.de